


APOLLONIA 2020

STATISTIK KARIESPAPHYLAXE
AKTION 2009/2010

 **JAKSCH & PARTNER**



INHALT

| | |
|-----------------------------|----|
| INHALT | 1 |
| ABBILDUNGSVERZEICHNIS | 2 |
| STUDIENECKDATEN | 4 |
| ANALYSEDESIGN | 5 |
| DEFINITIONEN | 6 |
| DESKRIPTION | 10 |
| VERGLEICH 2009/2010..... | 12 |
| SPOTS | 13 |
| ART DER ZÄHNE | 15 |
| DURCHSCHNITTSALTER | 20 |
| ZUSTAND DER GEBISSE | 25 |
| DMFT gemischt / dmft | 44 |
| MUNDHYGIENE | 60 |
| KIEFERORTHOPÄDIE..... | 65 |
| KARIES | 70 |
| TABELLENBAND | 75 |
| RECHTE | 92 |

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

| | |
|--|----|
| Abbildung 1: Art der Zähne / Geschlecht..... | 16 |
| Abbildung 2: Art der Zähne / Kindergarten – Schule..... | 16 |
| Abbildung 3: Art der Zähne / urban – nicht urban..... | 16 |
| Abbildung 4: Art der Zähne / Viertel..... | 17 |
| Abbildung 5: Art der Zähne / Jahrgang..... | 17 |
| Abbildung 6: Art der Zähne / Alter..... | 18 |
| Abbildung 7: Art der Zähne / Bezirk..... | 19 |
| Abbildung 8: Durchschnittsalter / Geschlecht..... | 21 |
| Abbildung 9: Durchschnittsalter / Kindergarten – Schule..... | 21 |
| Abbildung 10: Durchschnittsalter / urban – nicht urban..... | 21 |
| Abbildung 11: Durchschnittsalter / Viertel..... | 22 |
| Abbildung 12: Durchschnittsalter / Jahrgang..... | 22 |
| Abbildung 13: Durchschnittsalter / Alter..... | 23 |
| Abbildung 14: Durchschnittsalter / Bezirk..... | 24 |
| Abbildung 15: Zustand der Gebisse – kariös / Geschlecht..... | 26 |
| Abbildung 16: Zustand der Gebisse – kariös / Kindergarten – Schule..... | 26 |
| Abbildung 17: Zustand der Gebisse – kariös / urban – nicht urban..... | 26 |
| Abbildung 18: Zustand der Gebisse – kariös / Viertel..... | 27 |
| Abbildung 19: Zustand der Gebisse – kariös / Jahrgang..... | 27 |
| Abbildung 20: Zustand der Gebisse – kariös / Alter..... | 28 |
| Abbildung 21: Zustand der Gebisse – kariös / Bezirk..... | 29 |
| Abbildung 22: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Geschlecht..... | 31 |
| Abbildung 23: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Kindergarten – Schule..... | 31 |
| Abbildung 24: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / urban – nicht urban..... | 31 |
| Abbildung 25: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Viertel..... | 32 |
| Abbildung 26: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Jahrgang..... | 32 |
| Abbildung 27: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Alter..... | 33 |
| Abbildung 28: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Bezirk..... | 34 |
| Abbildung 29: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Kindergärten und Schulen..... | 36 |

| | |
|--|----|
| Abbildung 30: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Kindergärten..... | 37 |
| Abbildung 31: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Schulen | 38 |
| Abbildung 32: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Geschlecht | 39 |
| Abbildung 33: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Kindergarten – Schule | 39 |
| Abbildung 34: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / urban – nicht urban | 39 |
| Abbildung 35: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Viertel | 40 |
| Abbildung 36: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Jahrgang | 40 |
| Abbildung 37: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Alter | 41 |
| Abbildung 38: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Bezirk | 42 |
| Abbildung 39: DMFT gemischt vs. dmft / Geschlecht..... | 45 |
| Abbildung 40: DMFT gemischt vs. dmft / Kindergarten – Schule..... | 45 |
| Abbildung 41: DMFT gemischt vs. dmft / urban – nicht urban | 45 |
| Abbildung 42: DMFT gemischt vs. dmft / Viertel..... | 46 |
| Abbildung 43: DMFT gemischt vs. dmft / Jahrgang..... | 46 |
| Abbildung 44: DMFT gemischt vs. dmft / Alter | 47 |
| Abbildung 45: DMFT gemischt vs. dmft / Bezirk..... | 48 |
| Abbildung 46: DMFT gemischt kategorisiert / Bezirke..... | 49 |
| Abbildung 47: DMFT gemischt kategorisiert / Viertel | 49 |
| Abbildung 48: dmft kategorisiert / Bezirke | 51 |
| Abbildung 49: dmft kategorisiert / Viertel | 51 |
| Abbildung 50: DMFT gemischt kategorisiert / Bezirke (6-jährige)..... | 54 |
| Abbildung 51: DMFT gemischt kategorisiert / Viertel (6-jährige)..... | 54 |
| Abbildung 52: dmft kategorisiert / Bezirke (6-jährige)..... | 56 |
| Abbildung 53: dmft kategorisiert / Viertel (6-jährige) | 56 |
| Abbildung 54: Durchschnittsalter vs. DMFT gemischt..... | 58 |
| Abbildung 55: Durchschnittsalter vs. dmft | 59 |
| Abbildung 56: Mundhygiene / Geschlecht | 61 |
| Abbildung 57: Mundhygiene / Kindergarten – Schule | 61 |
| Abbildung 58: Mundhygiene / urban – nicht urban | 61 |
| Abbildung 59: Mundhygiene / Viertel | 62 |
| Abbildung 60: Mundhygiene / Jahrgang | 62 |
| Abbildung 61: Mundhygiene / Alter | 63 |
| Abbildung 62: Mundhygiene / Bezirk | 64 |
| Abbildung 63: Kieferorthopädie empfohlen / Geschlecht | 66 |
| Abbildung 64: Kieferorthopädie empfohlen / Kindergarten – Schule..... | 66 |
| Abbildung 65: Kieferorthopädie empfohlen / urban – nicht urban | 66 |
| Abbildung 66: Kieferorthopädie empfohlen / Viertel | 67 |
| Abbildung 67: Kieferorthopädie empfohlen / Jahrgang | 67 |
| Abbildung 68: Kieferorthopädie empfohlen / Alter | 68 |
| Abbildung 69: Kieferorthopädie empfohlen / Bezirk | 69 |
| Abbildung 70: Karies / Geschlecht..... | 71 |
| Abbildung 71: Karies / Kindergarten – Schule..... | 71 |
| Abbildung 72: Karies / urban – nicht urban..... | 71 |
| Abbildung 73: Karies / Viertel..... | 72 |
| Abbildung 74: Karies / Jahrgang..... | 72 |
| Abbildung 75: Karies / Alter..... | 73 |
| Abbildung 76: Karies / Bezirk..... | 74 |

STUDIENECKDATEN

| | |
|------------------------|---|
| □ STUDIENNUMMER | 12910 |
| □ STUDIENAUFTRAGGEBER | Landeszahnärztekammer NÖ |
| □ ANALYSEINSTITUT | Institut für statistische Analysen Jaksch & Partner GmbH A-4020 Linz, Schillerstraße 8 T.: 070.604260, I.: www.jaksch-partner.at |
| □ STUDIENLEITUNG | Mag. Edith Jaksch |
| □ STATISTISCHE ANALYSE | Mag. Christian Fritz, BSc |

ANALYSEDESIGN

Ziel der Studie ist einerseits die Erfassung der Zahngesundheit bzw. des Kariesbefalls niederösterreichischer Kinder und in weiterer Folge die Analyse der erfassten Daten. Zur Erhebung fundierter Daten über die Zahngesundheit werden seit dem Schuljahr 2002/2003 umfangreiche systematische Reihenuntersuchungen in Schulen und Kindergärten durchgeführt. Für die Bestimmung der Kariesprävalenz wurde der DMFT gemischt bzw. der dmft Index benutzt.

DEFINITIONEN

■ DATENERFASSUNG

An Jaksch & Partner gesandte Untersuchungsbögen im Zeitraum September 2009 bis September 2010 wurden mittels einer fortlaufenden Identifikationsnummer erfasst. Die Dateneingabe umfasste die Registrierung der folgenden Daten:

- Laufende Nummer
- Kindergarten bzw. Schuldaten
- Arztdaten
- Untersuchungsdaten (Datum und Ort der Untersuchungen)
- Probandendaten (Geschlecht und Geburtsdatum der Kinder)
- Kariesdaten → Codierung der Milchzähne und bleibenden Zähne:
 - Gesund (Code 1)
 - Kariös (Code 2)
 - Füllung (Code 3)
 - Noch nicht durchgebrochener Zahn (altersgemäß fehlender Milchzahn) („leer“/ wurde zur weiteren Verarbeitung auf 0 codiert)
 - Extrahiert (bei Milchzähnen auch vorzeitiger Zahnverlust) (Code X)
 - Fissurenversiegelung (prophylaktisch) (Code 4)
- Mundhygiene (gut/mangelhaft)
- Kieferorthopädie (Behandlung/Kontrolle empfohlen)
- Karies (Behandlung/Kontrolle empfohlen)

Insgesamt wurden 44.828 Untersuchungsbögen an Jaksch & Partner übermittelt. Aufgrund von Plausibilitätschecks, die anschließend näher beschrieben werden, blieben 44.618 Untersuchungsbögen über, die für die Analyse herangezogen werden konnten. Dies entspricht einem Prozentsatz von 99,5 Prozent.

■ PLAUSIBILITÄT

Die Überprüfung der Daten erfolgte in mehreren Stufen:

- Überprüfung auf Vollständigkeit der Daten:
 - Kindergarten- / Schuldaten
 - Arztdaten
 - Untersuchungstermin
 - Probandendaten (Geschlecht, Geburtsdatum)
- Alter
 - Das Alter wurde tagesgenau (365 Tage) zum Untersuchungstermin bestimmt. Die Altersgrenzen wurden mit „mindestens 2 Jahre“ und „maximal 15 Jahre“ festgesetzt.
 - Ausnahmen:
Es wurden 76 Kinder über 15 Jahren (Kinder in Sonderschulen) in dem endgültigen Datensatz belassen.
 - Es wurden 12 Kinder unter 2 Jahren in dem endgültigen Datensatz belassen.
 - Untersuchungsbögen, bei denen das Geburtsdatum der Kinder nicht vorhanden war und somit keine Altersberechnung durchgeführt werden konnte, wurden herausgenommen.

- Fehlcodierungen der Milchzähne bzw. bleibenden Zähne (doppelte Codierung)
 - Welche Codierungskombinationen zu einem Ausscheiden der Untersuchungsbögen führte bzw. in welchen Fällen Umcodierungen vorgenommen werden mussten, lässt sich in der folgenden Matrix ablesen:

Plausibilitätsmatrix – Fehlcodierung:

| | | bleibende Zähne [1..2..3..4.] | | | | | | |
|-----------------------------|--------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | Code „leer“ | 1 | 2 | 3 | 0 | X | 4 |
| Milchzähne [5..6..7..8.] | „leer“ | mz=0 | bz=1 | bz=2 | bz=3 | mz=0 | bz=X | bz=4 |
| | 1 | mz=1 | - | - | - | mz=1 | - | - |
| | 2 | mz=2 | - | - | - | mz=2 | - | - |
| | 3 | mz=3 | - | - | - | mz=3 | - | - |
| | 0 | mz=0 | bz=1 | bz=2 | bz=3 | mz=0 | bz=X | bz=4 |
| | X | mz=X | bz=1 | bz=2 | bz=3 | mz=X | mz=X | bz=4 |
| | 4 | mz=4 | - | - | - | mz=4 | - | - |

Legende: mz ... Milchzahn
 bz ... bleibender Zahn
 „-“ ... Datensatz ausscheiden

Ausnahmen für Schneidezähne: mz = [1,2,3,4]
 bz = 1

Lesebeispiele:

z.B. Milchzahn „55“ und bleibender Zahn „15“ (gleiche Stelle)

... ist Milchzahn mit 2 codiert und bleibender Zahn mit 2 codiert, so ist der Datensatz auszuschneiden („-“).

... ist Milchzahn mit 2 codiert, bleibender Zahn mit 0 codiert, so ist der Milchzahn auf 2 zu belassen und der bleibende Zahn auf „leer“ zu setzen.“

... ist Milchzahn mit 0 codiert, bleibender Zahn mit 2 codiert, so ist der Milchzahn auf „leer“ zu setzen und der bleibende Zahn auf 2 zu belassen.“

Bei den Schneidezähnen gilt folgende Ausnahme:

Ist ein Milchzahn mit 1,2,3 oder 4 codiert und der bleibende Zahn an der gleichen Stelle mit 1 codiert, dann bleiben beide Codierungen erhalten.

Fehlende Codierungen bei den Molaren wurden auf Code „0“ (altersgemäß fehlend, noch nicht durchbrochener Zahn) gesetzt.

- Kontrolle des Zahndurchbruchs
 - Mit entsprechenden Altersgrenzen wird festgestellt, ob Untersuchungsbögen ausgeschieden werden müssen, oder ob Umcodierungen vorgenommen werden. Dies lässt sich tabellarisch wie folgt zusammenfassen:

Plausibilitätsmatrix – Zahndurchbruch:

| Zähne | Altersgrenzen in Jahren | | |
|-------|--|--|---|
| | Durchbruch der bleibenden Zähne | altersgemäß fehlender Milchzahn bzw. bleibender Zahn | vorzeitiger Zahnverlust bzw. extrahierter Milchzahn |
| .1 | $\geq 4,5$ | $\geq 4,5$ | $< 4,5$ |
| .2 | $\geq 5,5$ | $\geq 5,5$ | $< 5,5$ |
| .3 | $\geq 6,5$ | $\geq 6,5$ | $< 6,5$ |
| .4 | $\geq 6,5$ | $\geq 6,5$ | $< 6,5$ |
| .5 | $\geq 6,5$ | $\geq 6,5$ | $< 6,5$ |
| .6 | $\geq 4,5$ | | |
| .7 | $\geq 9,5$ | | |
| | Alter nicht plausibel → Datensatz ausscheiden | Alter nicht plausibel → umcodieren | |

Es mussten insgesamt 76 Datensätze auf Grund von nicht plausiblen Daten aus der Analyse ausgeschlossen werden.

DESKRIPTION

| Verteilung | | (n) | % |
|---------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| Gesamt | | 44.618 | 100,0% |
| Geschlecht | weiblich | 21.444 | 48,4% |
| | männlich | 22.836 | 51,6% |
| Alter | 2 jährige | 684 | 1,5% |
| | 3 jährige | 3.990 | 8,9% |
| | 4 jährige | 5.492 | 12,3% |
| | 5 jährige | 6.421 | 14,4% |
| | 6 jährige | 7.636 | 17,1% |
| | 7 jährige | 7.334 | 16,4% |
| | 8 jährige | 812 | 1,8% |
| | 9 jährige | 3.888 | 8,7% |
| | 10 jährige | 7.281 | 16,3% |
| | 11 jährige | 743 | 1,7% |
| | 12 jährige und ältere | 325 | 0,7% |
| | Jahrgang | Jg. 2007 und jüngere | 1.581 |
| Jg. 2006 | | 4.696 | 10,5% |
| Jg. 2005 | | 5.862 | 13,1% |
| Jg. 2004 | | 6.497 | 14,6% |
| Jg. 2003 | | 8.466 | 19,0% |
| Jg. 2002 | | 4.907 | 11,0% |
| Jg. 2001 und ältere | | 12.609 | 28,3% |

| Verteilung | | (n) | % |
|-----------------------|------------------------|--------|--------|
| Gesamt | | 44.618 | 100,0% |
| Kindergarten / Schule | Kindergarten | 20.603 | 46,2% |
| | Schule | 24.015 | 53,8% |
| urban / nicht urban | urban | 7.595 | 17,0% |
| | nicht urban | 37.023 | 83,0% |
| Viertel | Mostviertel | 12.535 | 28,1% |
| | Industrieviertel | 16.762 | 37,6% |
| | Weinviertel | 9.173 | 20,6% |
| | Waldviertel | 6.148 | 13,8% |
| Bezirk | Krems an der Donau | 540 | 1,2% |
| | Sankt Pölten | 564 | 1,3% |
| | Waidhofen an der Ybbs | 446 | 1,0% |
| | Wiener Neustadt | 1.009 | 2,3% |
| | Amstetten | 3.106 | 7,0% |
| | Baden | 3.292 | 7,4% |
| | Bruck an der Leitha | 1.076 | 2,4% |
| | Gänserndorf | 2.531 | 5,7% |
| | Gmünd | 934 | 2,1% |
| | Hollabrunn | 1.721 | 3,9% |
| | Horn | 1.046 | 2,3% |
| | Korneuburg | 2.429 | 5,4% |
| | Krems Land | 1.528 | 3,4% |
| | Lilienfeld | 655 | 1,5% |
| | Melk | 2.152 | 4,8% |
| | Mistelbach | 2.165 | 4,9% |
| | Mödling | 3.571 | 8,0% |
| | Neunkirchen | 2.418 | 5,4% |
| | St.Pölten Land | 2.592 | 5,8% |
| | Scheibbs | 1.552 | 3,5% |
| | Tulln | 2.134 | 4,8% |
| | Waidhofen an der Thaya | 752 | 1,7% |
| | Wiener Neustadt Land | 2.024 | 4,5% |
| Wien-Umgebung | 3.137 | 7,0% | |
| Zwettl | 1.244 | 2,8% | |

VERGLEICH 2009/2010

| | | 2009 | | 2010 | |
|--------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|--------------|
| Personen: | | 40.857 | | 44.618 | |
| Geschlecht: | weiblich | 19.859 | 48,6% | 21.444 | 48,1% |
| | männlich | 20.965 | 51,3% | 22.863 | 51,2% |
| Durchschnittsalter: | | 7,16 | | 7,03 | |
| Art der Zähne: | Milchzähne | 588.465 | 66,4% | 662.510 | 68,8% |
| | bleibende Zähne | 298.403 | 33,6% | 299.742 | 31,2% |
| | Zähne gesamt | 886.868 | | 962.252 | |
| Fissurenversiegelung: | Milchzähne fissurenversiegelt | 121 | 0,0% | 142 | 0,0% |
| | bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.413 | 0,8% | 2.500 | 0,8% |
| | Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.534 | 0,3% | 2.642 | 0,3% |
| | Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,71 | | 21,57 | |
| Mundhygiene: | gut | 31.457 | 79,1% | 34.391 | 79,4% |
| | mangelhaft | 8.311 | 20,9% | 8.896 | 20,6% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | ja | 14.539 | 37,0% | 15.500 | 35,9% |
| | nein | 24.743 | 63,0% | 27.712 | 64,1% |
| Karies - Kontrolle: | ja | 15.392 | 39,6% | 16.347 | 38,1% |
| | nein | 23.479 | 60,4% | 26.611 | 61,9% |
| Zustand der Gebisse: | kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn) | 16.516 | 40,4% | 17.328 | 38,8% |
| | kariös, gefüllt, extrahiert | 21.428 | 52,4% | 21.931 | 49,2% |
| | davon bis zwei | 7.971 | 19,5% | 8.368 | 18,8% |
| | davon bis vier | 5.282 | 12,9% | 5.403 | 12,1% |
| | davon über vier | 8.175 | 20,0% | 8.160 | 18,3% |
| | kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 19.429 | 47,6% | 22.687 | 50,8% |
| DMFT gemischt / dmft | DMFT gemischt | 2,26 | | 2,10 | |
| | dmft | 1,92 | | 1,79 | |

SPOTS

1. In der Analyse Kariesprophylaxe 2009/2010 konnte ein mittlerer DMFT gemischt von 2,10 errechnet werden, der mittlere dmft liegt bei 1,79
2. Die DMFT Werte im Vorjahr waren höher (2008/2009 DMFT 2,26).
3. Der dmft ist gegenüber dem Vorjahr gesunken (2008/2009 dmft 1,92)
4. Die Auswertung der 6 – jährigen ergab einen durchschnittlichen DMFT–Wert von 2,22 einen dmft-Wert von 2,14
5. Die Kinder im östlichen Niederösterreich haben gesündere Zähne, es gibt ein Ost- Westgefälle
6. Das Durchschnittsalter der Kinder liegt bei 7,03 Jahren (2008/2009 7,16)
7. Der Zustand des Gebisses ist bei männlichen Kindern schlechter
8. Männliche Kinder haben nicht nur seltener ein völlig gesundes Gebiss, sie haben auch häufiger eine höhere Anzahl an nicht gesunden Zähnen
9. Die Zahngesundheit der Kinder aus dem städtischen Bereich ist schlechter
10. Die Verteilung des Durchschnittsalters in den Bezirken weicht stark ab
11. Die wenigsten bleibenden Zähne haben die Kinder aus dem Industrieviertel, die meisten Zähne die Kinder aus dem Waldviertel
12. 38,8 Prozent aller untersuchten Kinder haben zumindest einen kariösen Zahn (2008/2009 40,4 Prozent)
13. 40,7 Prozent der 6-jährigen (2008/2009 43,0 Prozent) haben zumindest einen kariösen Zahn
14. 49,2 Prozent (2008/2009 52,4 Prozent) der untersuchten Kinder haben zumindest einen kariösen, gefüllten oder extrahierten Zahn
15. Etwas weniger als die Hälfte der 6-jährigen (49,3 Prozent) hat zumindest einen kariösen, gefüllten oder extrahierten Zahn

16. Ein kariesfreies Gebiss konnte erstmalig bei mehr als der Hälfte der Kinder (50,8 Prozent) festgestellt werden
17. Der Anteil der fissurenversiegelten Zähne liegt bei den bleibenden Zähnen bei 0,8 Prozent
18. 20,6 Prozent der untersuchten Kinder weisen eine mangelhafte Mundhygiene auf
19. Mehr als einem Drittel (35,9 Prozent) der untersuchten Kinder wird eine Kontrolle im Bereich der Kieferorthopädie empfohlen
20. 38,1 Prozent der Kinder wird eine Kariesbehandlung bzw. -kontrolle empfohlen
21. 49 Kinder die älter als 12 Jahre sind besuchen die 4. Klasse, alle anderen in diesem Alter kommen aus Sonderschulen

ART DER ZÄHNE

Die Verteilung aller Zähne an den untersuchten Kindern ergibt einen Anteil von 68,8 Prozent Milchzähne und einen Anteil von 31,2 Prozent bleibende Zähne.

Trennt man die Kinder hinsichtlich des Geschlechtes zeigt sich, dass sich nur geringe Unterschiede ergeben. Kinder im Kindergarten haben rund 4,7 Prozent bleibende Zähne, in den Schulen liegt der Anteil an bleibenden Zähnen bei 51,3 Prozent.

Erwartungsgemäß haben die untersuchten Kinder im Alter von 4 Jahren nur 0,1 Prozent (entspricht 160 Zähnen) bleibende Zähne, im Alter von 5 Jahren liegt der Anteil bei 4,1 Prozent. Der Anteil steigt kontinuierlich von 21,7 Prozent bei den 6jährigen, 37,2 Prozent bei den 7jährigen bis zu 95,8 Prozent bei den Kindern im Alter von 12 Jahren und älter. Betrachtet man die Verteilung in den Jahrgängen, so treten die ersten bleibenden Zähne bei Kindern aus dem Jahrgang 2005 (0,6 Prozent) auf. Das Gebiss der Kinder unter drei Jahren besteht ausschließlich aus Milchzähnen.

Kaum Unterschiede bezüglich der Art der Zähne können in den Vierteln bzw. bei Kindern aus dem städtischen und dem ländlichen Raum festgestellt werden. Die wenigsten bleibenden Zähne haben die Kinder aus dem Industrieviertel (30,5 Prozent) die meisten Zähne die Kinder aus dem Waldviertel (33,1 Prozent).

Interessante Unterschiede konnten auch in den Bezirken festgestellt werden. Der Anteil der bleibenden Zähne variiert von 5,2 Prozent in St. Pölten Stadt bis zu 47,2 Prozent in Waidhofen an der Ybbs.




Abbildung 1: Art der Zähne / Geschlecht




Abbildung 2: Art der Zähne / Kindergarten – Schule




Abbildung 3: Art der Zähne / urban – nicht urban






Abbildung 4: Art der Zähne / Viertel




Abbildung 5: Art der Zähne / Jahrgang






Abbildung 6: Art der Zähne / Alter






Abbildung 7: Art der Zähne / Bezirk

DURCHSCHNITTSALTER

Insgesamt verzeichnen wir ein Durchschnittsalter von 7,03 Jahren (2009: 7,16 Jahre). Das Durchschnittsalter der Mädchen und Buben unterscheidet sich nur geringfügig, die Kinder aus der Stadt und jene aus dem ländlichen Raum unterscheiden sich bezüglich des Durchschnittsalters deutlich (urban 8,21, nicht urban 5,89 Jahre).

Das Alter der Untersuchten in den Kindergärten liegt bei 4,93 Jahren (2009: 4,98 Jahre), in der Schule liegt dieses bei 8,82 Jahren (2009: 8,71 Jahre).

Interessant ist die Verteilung des Durchschnittsalters in den Bezirken. So zeigt sich, dass parallel zu der Verteilung der Zähne nach Milch- und bleibenden Zähnen die Verteilung des Durchschnittsalters stark abweicht. In Waidhofen an der Ybbs liegt dieses bei 8,27 und in St. Pölten Stadt bei 5,11 Jahren.




Abbildung 8: Durchschnittsalter / Geschlecht




Abbildung 9: Durchschnittsalter / Kindergarten – Schule




Abbildung 10: Durchschnittsalter / urban – nicht urban




Abbildung 11: Durchschnittsalter / Viertel




Abbildung 12: Durchschnittsalter / Jahrgang




Abbildung 13: Durchschnittsalter / Alter




Abbildung 14: Durchschnittsalter / Bezirk

ZUSTAND DER GEBISSE

■ kariös (Anteil)

38,8 (2009: 40,4) Prozent aller untersuchten Kinder haben zumindest einen kariösen Zahn. Männliche Kinder haben zu 40,7 Prozent zumindest einen kariösen Zahn, weibliche Kinder nur zu 36,8 Prozent.

Rund 4 von 10 der 6-jährigen (40,7 Prozent) haben zumindest einen kariösen Zahn, bei den 7 – jährigen sind das bereits 47,5 Prozent, bei 8 – jährigen sind das 65,6 Prozent der Kinder. In den Kindergärten liegt der Anteil bei 30,7 (2009: 32,2) Prozent, in den Schulen bei 45,8 (2009: 46,2) Prozent.

Ein deutlicher Unterschied zeigt sich zwischen Kindern aus der Stadt (42,6 Prozent) und Kindern aus dem ländlichen Raum (38,1 Prozent). Auch regional sind Unterschiede nachzuweisen.

Im Bereich der Viertel ergibt sich folgendes Ranking: Im Industrieviertel 36,3 Prozent, im Weinviertel 36,8 Prozent, im Mostviertel 41,2 Prozent und im Waldviertel 43,0 Prozent der Gebisse mit zumindest einem kariösen Zahn.

Noch klarer sind die Abstände in den Bezirken, so eruieren wir in Mödling 29,9 Prozent, im Bezirk Waidhofen an der Ybbs 55,2 Prozent.




Abbildung 15: Zustand der Gebisse – kariös / Geschlecht




Abbildung 16: Zustand der Gebisse – kariös / Kindergarten – Schule




Abbildung 17: Zustand der Gebisse – kariös / urban – nicht urban






Abbildung 18: Zustand der Gebisse – kariös / Viertel




Abbildung 19: Zustand der Gebisse – kariös / Jahrgang






Abbildung 20: Zustand der Gebisse – kariös / Alter




Abbildung 21: Zustand der Gebisse – kariös / Bezirk

■ kariös, gefüllt, extrahiert (Anteil)

Die Analyse der Gebisse mit zumindest einem kariösen, gefüllten und extrahierten Zahn ergibt einen Anteil von gesamt 49,2 (2009: 52,4) Prozent. Bei männlichen Kindern liegt der Anteil bei 51,0 (2009: 54,1) Prozent, bei weiblichen Kindern sinkt dieser auf 47,1 (2009: 50,7) Prozent. In den Kindergärten liegt der Anteil bei 36,4 (2009: 39,1) Prozent, in den Schulen bei 60,1 (2009: 64,0) Prozent.

Analysiert man die Entwicklung in den Altersgruppen, so steigt der Anteil von 42,2 Prozent bei den 5-jährigen auf etwas weniger als die Hälfte der 6-jährigen (49,3 Prozent), bei den 7-jährigen sind das bereits 58,0 Prozent, bei 8-jährigen sind es schon rund drei Viertel der Kindern (76,4 Prozent).

Auch hier kristallisiert sich ein deutlicher Unterschied zwischen Kindern aus der Stadt (52,3 Prozent) und Kindern aus dem ländlichen Raum (48,6 Prozent) heraus.

Im Bereich der Viertel ergibt sich ein ähnliches Ranking wie im vorigem Abschnitt: Im Weinviertel 46,0 Prozent, im Industrieviertel 46,0 Prozent, im Mostviertel 52,6 Prozent und im Waldviertel 55,4 Prozent der Gebisse mit zumindest einem kariösen, gefüllten oder extrahierten Zahn.

Auch die Abweichungen in den Bezirken sind augenscheinlich, am oberen Ende finden sich die Bezirke Waidhofen an der Ybbs mit 69,7 Prozent und Zwettl mit 61,4 Prozent, am besten sind die Werte in Wien Umgebung mit 41,2 Prozent und der Bezirk Mödling mit 38,6 Prozent.




Abbildung 22: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Geschlecht




Abbildung 23: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Kindergarten – Schule




Abbildung 24: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / urban – nicht urban




Abbildung 25: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Viertel




Abbildung 26: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Jahrgang




Abbildung 27: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Alter




Abbildung 28: Zustand der Gebisse – kariös, gefüllt, extrahiert / Bezirk

■ kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anteil)

Untersucht man die Verteilung des Zahngesundheitszustandes genauer, zerlegt man also den Anteil der kariösen, gefüllten und extrahierten Zähne nach der Anzahl der befallenen Zähne, so ergibt sich eine Verteilung von 18,8 (2009: 19,5) Prozent bis zwei befallene Zähne, 12,1 (2009: 12,9) Prozent haben bis zu vier und 18,3 (2009: 20,0) Prozent hat schon mehr als vier kariöse, gefüllte oder extrahierte Zähne. Kariesfreiheit konnte also bei 50,8 (2009: 47,6) Prozent der Kinder festgestellt werden. Männliche Kinder haben nicht nur seltener ein völlig gesundes Gebiss, sie haben auch häufiger eine höhere Anzahl an nicht gesunden Zähnen (über vier nicht gesunden Zähne: männlich 19,6 Prozent, weiblich 16,8 Prozent).

Analysiert man die Entwicklung in den Altersgruppen, so steigt der Anteil der Kinder mit einer höheren Anzahl an schlechten Zähnen schneller als der Anteil der Kinder mit wenigen schlechten Zähnen. Bei mehr als einem Drittel der 8 – jährigen (38,3 Prozent) werden bei der Untersuchung mehr als vier kariöse, gefüllte oder extrahierte Zähne festgestellt.

Vergleichbar mit den Ergebnissen aus den vorigen Abschnitten ist auch an dieser Stelle feststellbar, dass die Kinder aus dem urbanen Bereich ein schlechteres Gebiss aufweisen. Der Anteil der Gebisse mit mehr als vier nicht gesunden Zähnen liegt bei 20,6 Prozent, bei Kindern aus dem ländlichen Raum sind dies nur 17,8 Prozent. In den Bezirken Waidhofen an der Ybbs (28,5 Prozent) und Zwettl (27,8 Prozent) ist der Anteil am höchsten, die Bezirke Hollabrunn (12,1 Prozent) und Bruck an der Leitha (12,4 Prozent) liegen deutlich unter dem Durchschnitt.




Abbildung 29: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Kindergärten und Schulen




Abbildung 30: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Kindergärten




Abbildung 31: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Schulen




Abbildung 32: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Geschlecht




Abbildung 33: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Kindergarten – Schule




Abbildung 34: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / urban – nicht urban






Abbildung 35: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Viertel




Abbildung 36: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Jahrgang






Abbildung 37: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Alter






Abbildung 38: Zustand der Gebisse – kariesfrei, kariös, gefüllt, extrahiert (Anzahl) / Bezirk

■ fissurenversiegelt (Anteil)

Der Anteil der fissurenversiegelten Zähne liegt bei den bleibenden Zähnen bei 0,8 (2009: 0,8) Prozent. Die meisten fissurenversiegelten Zähne werden im Alter von 9 und 10 Jahren gezählt, der Anteil liegt hier bei 0,7 Prozent. Bei den bleibenden Zähnen liegt der Anteil der Fissurenversiegelungen in diesen Altersgruppen bei 1,2 Prozent bzw. bei 1,0 Prozent.

DMFT gemischt / dmft

■ DMFT gemischt / dmft

Der DMFT-Wert beschreibt den individuellen Karies-Befall. Er basiert auf der Anzahl kariöser (decayed, D), fehlender (missing, M) und gefüllter (filled, F) Zähne (teeth, T). Seine Kalkulation bezieht sich entweder auf 32 oder auf 28 bleibende Zähne (im zweiten Fall werden die Weisheitszähne nicht berücksichtigt). Ein DMF-T-Wert von $4-3-9=16$ bedeutet, dass 4 Zähne kariös sind, 3 Zähne fehlen und 9 Zähne Füllungen aufweisen; dementsprechend sind 12 Zähne intakt. (Quelle: <http://www.whocollab.od.mah.se/expl/orhdmft.html>)

Zur Bestimmung der Zahngesundheit wird der DMFT bzw. dmft herangezogen. In der Untersuchung zur Kariesprophylaxe 2009/2010 konnte ein mittlerer DMFT gemischt von 2,10 errechnet werden, der mittlere dmft liegt bei 1,79.

Der Vergleich des DMFT bzw. dmft – Wertes in Bezug auf die Urbanität der Kinder ergibt eine eindeutige Differenzierung. Für Kinder aus dem städtischen Raum liegt der DMFT bei 2,33 (dmft 2,01), Kinder aus dem nicht urbanen Raum haben einen DMFT von 2,05 (dmft 1,75). Schüler haben einen DMFT von 2,44 (dmft 1,88) Kindergartenkinder einen DMFT - Wert von 1,71 (dmft 1,69).

Es können starke regionale Effekte ausfindig gemacht werden. Die Analyse, differenziert nach den Vierteln zeigt eine deutlich höhere Zahngesundheit bei den Kindern im Weinviertel (DMFT 1,89, dmft 1,59) und bei den Kindern der Region Waldviertel (DMFT 2,34, dmft 1,99). Differenziert man den DMFT/dmft nach Bezirken erhöht sich die Spannweite von 1,58 (Hollabrunn) bis 3,09 (Waidhofen an der Ybbs) im Bereich des DMFT-Wertes. Der Range des dmft reicht von 1,36 in Tulln und 2,54 in St. Pölten.




Abbildung 39: DMFT gemischt vs. dmft / Geschlecht




Abbildung 40: DMFT gemischt vs. dmft / Kindergarten – Schule




Abbildung 41: DMFT gemischt vs. dmft / urban – nicht urban




Abbildung 42: DMFT gemischt vs. dmft / Viertel




Abbildung 43: DMFT gemischt vs. dmft / Jahrgang




Abbildung 44: DMFT gemischt vs. dmft / Alter




Abbildung 45: DMFT gemischt vs. dmft / Bezirk




Abbildung 46: DMFT gemischt kategorisiert / Bezirke




Abbildung 47: DMFT gemischt kategorisiert / Viertel

| | | DMFT gemischt |
|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| Gesamt | | 2,10 |
| Geschlecht | weiblich | 1,95 |
| | männlich | 2,23 |
| urban / nicht urban | urban | 2,33 |
| | nicht urban | 2,05 |
| Viertel | Weinviertel | 1,89 |
| | Industrieviertel | 2,02 |
| | Mostviertel | 2,24 |
| | Waldviertel | 2,34 |
| Bezirk | Hollabrunn | 1,58 |
| | Bruck an der Leitha | 1,59 |
| | Tulln | 1,60 |
| | Wien-Umgebung | 1,63 |
| | Korneuburg | 1,70 |
| | Mödling | 1,70 |
| | Horn | 1,92 |
| | Krems an der Donau | 2,11 |
| | Gänserndorf | 2,12 |
| | Gmünd | 2,13 |
| | St.Pölten Land | 2,13 |
| | Mistelbach | 2,13 |
| | Krems Land | 2,15 |
| | Scheibbs | 2,22 |
| | Neunkirchen | 2,22 |
| | Amstetten | 2,28 |
| | Baden | 2,32 |
| | Waidhofen an der Thaya | 2,38 |
| | Wiener Neustadt Land | 2,43 |
| | Wiener Neustadt | 2,49 |
| | Sankt Pölten | 2,56 |
| | Melk | 2,59 |
| Lilienfeld | 2,76 | |
| Zwettl | 2,89 | |
| Waidhofen an der Ybbs | 3,09 | |




Abbildung 48: dmft kategorisiert / Bezirke




Abbildung 49: dmft kategorisiert / Viertel



| | | dmft |
|---------------------|------------------------|-------------|
| Gesamt | | 1,79 |
| Geschlecht | weiblich | 1,64 |
| | männlich | 1,93 |
| urban / nicht urban | urban | 2,01 |
| | nicht urban | 1,75 |
| Viertel | Weinviertel | 1,59 |
| | Industrieviertel | 1,73 |
| | Mostviertel | 1,93 |
| | Waldviertel | 1,99 |
| Bezirk | Tulln | 1,36 |
| | Hollabrunn | 1,39 |
| | Bruck an der Leitha | 1,42 |
| | Wien-Umgebung | 1,45 |
| | Korneuburg | 1,49 |
| | Mödling | 1,49 |
| | Horn | 1,70 |
| | Gänserndorf | 1,74 |
| | Krems Land | 1,76 |
| | Krems an der Donau | 1,79 |
| | Mistelbach | 1,80 |
| | St.Pölten Land | 1,86 |
| | Scheibbs | 1,91 |
| | Neunkirchen | 1,92 |
| | Gmünd | 1,93 |
| | Baden | 1,94 |
| | Wiener Neustadt Land | 1,95 |
| | Waidhofen an der Thaya | 2,01 |
| | Amstetten | 2,02 |
| | Melk | 2,09 |
| | Wiener Neustadt | 2,12 |
| | Lilienfeld | 2,22 |
| | Waidhofen an der Ybbs | 2,30 |
| | Zwettl | 2,48 |
| | Sankt Pölten | 2,54 |

■ DMFT gemischt / dmft (in den Altersgruppen)

Die Altersgruppe der 6 – jährigen (Schuleintrittsalter) wird in epidemiologischen Studien gern als Referenzaltersgruppe herangezogen. Aber auch um Trends und Entwicklungen des Kariesgeschehens abschätzen zu können werden die 6 – jährigen verglichen. Die Auswertung der Kariesprävalenzdaten ergab einen durchschnittlichen DMFT-Wert von 2,22, einen dmft-Wert von 2,14. Die Analyse eines speziellen Jahrganges oder einer Altersgruppe entschärft den Bias, der zum Beispiel durch ein stark abweichendes Durchschnittsalter entsteht. Die Analyse einer Gruppe erlaubt eine normierte Betrachtung.

Offensichtlich zu erkennen ist ein Ost- Westgefälle, die Kinder im östlichen Niederösterreich (Weinviertel und Industrieviertel) erfreuen sich einer höheren Zahngesundheit.




Abbildung 50: DMFT gemischt kategorisiert / Bezirke (6-jährige)




Abbildung 51: DMFT gemischt kategorisiert / Viertel (6-jährige)



DMFT gemischt

| | | 3 jährige | 4 jährige | 5 jährige | 6 jährige | 7 jährige | 8 jährige | 9 jährige | 10 jährige | 11 jährige |
|---------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Gesamt | | 0,94 | 1,54 | 2,05 | 2,22 | 2,56 | 3,92 | 2,31 | 2,27 | 2,91 |
| Geschlecht | weiblich | 0,78 | 1,43 | 1,84 | 2,07 | 2,46 | 3,84 | 2,21 | 2,11 | 3,13 |
| | männlich | 1,09 | 1,63 | 2,24 | 2,35 | 2,63 | 3,92 | 2,40 | 2,43 | 2,74 |
| urban / nicht urban | urban | 1,15 | 1,85 | 2,36 | 2,48 | 2,92 | 3,84 | 2,41 | 2,30 | 2,69 |
| | nicht urban | 0,90 | 1,48 | 1,98 | 2,17 | 2,49 | 3,94 | 2,28 | 2,27 | 2,97 |
| Viertel | Weinviertel | 0,81 | 1,29 | 1,78 | 1,99 | 2,29 | 3,83 | 2,07 | 2,22 | 2,65 |
| | Industrieviertel | 0,99 | 1,56 | 2,13 | 2,12 | 2,46 | 3,89 | 2,16 | 1,95 | 2,86 |
| | Mostviertel | 0,89 | 1,63 | 2,07 | 2,40 | 2,78 | 4,39 | 2,44 | 2,52 | 3,06 |
| | Waldviertel | 1,12 | 1,65 | 2,14 | 2,48 | 2,81 | 3,39 | 2,69 | 2,58 | 3,15 |
| Bezirk | Tulln | 0,51 | 1,27 | 1,31 | 1,61 | 2,00 | 4,00 | 2,07 | 2,32 | 2,52 |
| | Hollabrunn | 0,88 | 0,85 | 1,23 | 1,65 | 2,24 | 3,17 | 1,89 | 2,23 | 1,93 |
| | Mödling | 0,90 | 1,35 | 1,88 | 1,67 | 2,15 | 2,53 | 2,06 | 1,79 | 2,61 |
| | Wien-Umgebung | 0,74 | 1,41 | 1,75 | 1,87 | 1,98 | 4,06 | 1,58 | 1,42 | 2,20 |
| | Bruck an der Leitha | 0,55 | 1,30 | 1,58 | 1,89 | 1,88 | 4,00 | 1,60 | 1,85 | 3,09 |
| | Korneuburg | 0,59 | 1,05 | 1,49 | 1,96 | 2,10 | 4,49 | 1,95 | 2,17 | 3,23 |
| | Krems an der Donau | 1,55 | 0,85 | 1,97 | 2,04 | 3,07 | 3,58 | 2,51 | 2,23 | 2,25 |
| | Krems Land | 1,13 | 0,88 | 1,92 | 2,09 | 2,70 | 3,61 | 2,17 | 2,65 | 2,59 |
| | Gänserndorf | 1,06 | 1,54 | 2,27 | 2,19 | 2,44 | 3,56 | 1,88 | 2,40 | 2,09 |
| | Waidhofen an der Thaya | 0,89 | 1,67 | 2,23 | 2,20 | 2,92 | 2,60 | 2,94 | 3,01 | 3,70 |
| | Horn | 0,81 | 1,45 | 1,68 | 2,26 | 2,50 | 2,90 | 2,35 | 1,96 | 2,11 |
| | Neunkirchen | 1,22 | 2,02 | 2,38 | 2,27 | 2,57 | 3,62 | 2,41 | 2,24 | 3,09 |
| | Baden | 1,04 | 1,68 | 2,26 | 2,30 | 2,93 | 4,35 | 2,07 | 2,13 | 2,99 |
| | Melk | 0,94 | 1,60 | 1,86 | 2,35 | 3,31 | 4,60 | 3,07 | 2,80 | 3,77 |
| | Mistelbach | 1,08 | 1,65 | 2,31 | 2,37 | 2,34 | 4,10 | 2,56 | 2,10 | 4,07 |
| | Scheibbs | 0,69 | 1,46 | 2,11 | 2,38 | 2,48 | 4,39 | 2,83 | 2,61 | 3,76 |
| | Amstetten | 1,00 | 1,73 | 1,98 | 2,39 | 2,84 | 4,51 | 2,55 | 2,45 | 3,21 |
| | Wiener Neustadt Land | 1,02 | 1,30 | 2,26 | 2,46 | 2,91 | 6,08 | 3,10 | 2,70 | 3,11 |
| | Gmünd | 0,76 | 2,40 | 2,08 | 2,55 | 2,18 | 2,53 | 2,07 | 2,06 | 3,73 |
| | St.Pölten Land | 0,88 | 1,57 | 2,06 | 2,64 | 2,65 | 4,62 | 2,06 | 2,12 | 2,58 |
| | Sankt Pölten | 1,31 | 2,43 | 3,07 | 2,88 | 0,57 | | | | |
| | Wiener Neustadt | 1,74 | 2,12 | 2,92 | 2,94 | 2,56 | 3,58 | 2,70 | 1,44 | 3,27 |
| | Lilienfeld | 0,80 | 2,76 | 2,18 | 2,96 | 3,20 | 3,44 | 2,88 | 2,68 | 3,50 |
| | Zwettl | 1,63 | 1,99 | 2,87 | 3,25 | 3,16 | 4,04 | 3,36 | 2,98 | 4,31 |
| | Waidhofen an der Ybbs | 1,75 | 1,38 | 3,31 | 3,26 | 3,31 | 5,47 | 3,11 | 3,12 | 2,74 |




Abbildung 52: dmft kategorisiert / Bezirke (6-jährige)




Abbildung 53: dmft kategorisiert / Viertel (6-jährige)



| | | dmft | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | | 3 jährige | 4 jährige | 5 jährige | 6 jährige | 7 jährige | 8 jährige | 9 jährige | 10 jährige | 11 jährige |
| Gesamt | | 0,94 | 1,54 | 2,04 | 2,14 | 2,31 | 3,25 | 1,74 | 1,46 | 1,13 |
| Geschlecht | weiblich | 0,78 | 1,43 | 1,83 | 1,98 | 2,19 | 3,15 | 1,61 | 1,29 | 1,10 |
| | männlich | 1,09 | 1,63 | 2,24 | 2,27 | 2,40 | 3,27 | 1,88 | 1,63 | 1,15 |
| urban / nicht urban | urban | 1,15 | 1,85 | 2,35 | 2,39 | 2,61 | 3,18 | 1,95 | 1,49 | 0,99 |
| | nicht urban | 0,90 | 1,48 | 1,97 | 2,09 | 2,24 | 3,27 | 1,70 | 1,46 | 1,18 |
| Viertel | Weinviertel | 0,81 | 1,29 | 1,77 | 1,91 | 2,10 | 3,19 | 1,57 | 1,39 | 1,21 |
| | Industrieviertel | 0,99 | 1,56 | 2,13 | 2,04 | 2,22 | 3,29 | 1,57 | 1,21 | 1,11 |
| | Mostviertel | 0,89 | 1,63 | 2,06 | 2,31 | 2,48 | 3,51 | 1,90 | 1,65 | 1,13 |
| | Waldviertel | 1,12 | 1,65 | 2,14 | 2,40 | 2,51 | 2,81 | 2,08 | 1,76 | 1,07 |
| Bezirk | Tulln | 0,51 | 1,27 | 1,30 | 1,55 | 1,81 | 3,19 | 1,57 | 1,49 | 0,80 |
| | Mödling | 0,90 | 1,35 | 1,88 | 1,60 | 1,90 | 2,11 | 1,57 | 1,10 | 0,95 |
| | Hollabrunn | 0,88 | 0,85 | 1,22 | 1,62 | 2,15 | 2,91 | 1,54 | 1,68 | 0,98 |
| | Wien-Umgebung | 0,74 | 1,41 | 1,75 | 1,82 | 1,82 | 3,64 | 1,20 | 1,00 | 1,42 |
| | Bruck an der Leitha | 0,55 | 1,30 | 1,57 | 1,83 | 1,78 | 3,67 | 1,15 | 1,20 | 1,00 |
| | Korneuburg | 0,59 | 1,05 | 1,48 | 1,88 | 2,00 | 3,89 | 1,53 | 1,50 | 1,68 |
| | Krems an der Donau | 1,55 | 0,85 | 1,97 | 1,92 | 2,74 | 2,75 | 2,03 | 1,61 | 0,69 |
| | Krems Land | 1,13 | 0,88 | 1,92 | 2,01 | 2,38 | 3,09 | 1,69 | 1,73 | 0,74 |
| | Gänserndorf | 1,06 | 1,54 | 2,26 | 2,10 | 2,17 | 2,84 | 1,43 | 1,29 | 0,93 |
| | Waidhofen an der Thaya | 0,89 | 1,67 | 2,23 | 2,17 | 2,59 | 2,20 | 2,22 | 2,12 | 1,30 |
| | Horn | 0,81 | 1,45 | 1,66 | 2,17 | 2,25 | 2,45 | 1,93 | 1,38 | 1,00 |
| | Neunkirchen | 1,22 | 2,02 | 2,38 | 2,19 | 2,28 | 3,24 | 1,69 | 1,33 | 1,37 |
| | Baden | 1,04 | 1,68 | 2,25 | 2,21 | 2,68 | 3,72 | 1,58 | 1,32 | 0,90 |
| | Melk | 0,94 | 1,60 | 1,84 | 2,22 | 2,84 | 3,26 | 2,52 | 1,77 | 1,09 |
| | Mistelbach | 1,08 | 1,65 | 2,30 | 2,27 | 2,10 | 3,57 | 1,82 | 1,24 | 1,78 |
| | Scheibbs | 0,69 | 1,46 | 2,09 | 2,29 | 2,12 | 3,43 | 2,23 | 1,84 | 1,55 |
| | Amstetten | 1,00 | 1,73 | 1,98 | 2,32 | 2,65 | 3,67 | 2,06 | 1,67 | 1,48 |
| | Wiener Neustadt Land | 1,02 | 1,30 | 2,24 | 2,33 | 2,57 | 4,75 | 2,00 | 1,56 | 1,00 |
| | Gmünd | 0,76 | 2,40 | 2,08 | 2,48 | 2,01 | 2,13 | 1,73 | 1,57 | 1,73 |
| | St.Pölten Land | 0,88 | 1,57 | 2,05 | 2,56 | 2,43 | 4,05 | 1,53 | 1,34 | 0,89 |
| | Lilienfeld | 0,80 | 2,76 | 2,18 | 2,78 | 2,73 | 2,22 | 1,91 | 1,63 | 1,20 |
| | Sankt Pölten | 1,31 | 2,43 | 3,05 | 2,82 | 0,43 | | | | |
| | Wiener Neustadt | 1,74 | 2,12 | 2,88 | 2,85 | 2,31 | 2,87 | 2,02 | 0,79 | 1,14 |
| | Zwettl | 1,63 | 1,99 | 2,86 | 3,14 | 2,90 | 3,42 | 2,38 | 2,06 | 1,54 |
| | Waidhofen an der Ybbs | 1,75 | 1,38 | 3,31 | 3,19 | 2,74 | 4,73 | 2,32 | 1,80 | 0,68 |

■ DMFT gemischt / Durchschnittsalter / DMFT gemischt (6-jährige)




Abbildung 54: Durchschnittsalter vs. DMFT gemischt

■ dmft / Durchschnittsalter / dmft (6-jährige)




Abbildung 55: Durchschnittsalter vs. dmft

MUNDHYGIENE

79,4 Prozent der untersuchten Kinder wird eine gute Mundhygiene attestiert, Mädchen (81,8 Prozent) putzen Ihre Zähne gründlicher als ihre männlichen Kollegen (77,3 Prozent).

Ist die Mundhygiene in den Kindergärten noch bei 86,5 Prozent eine gute, so fällt dieser Anteil in den Schulen auf 73,4 Prozent. Der Anteil derer, die ihre Mundhygiene ernst nehmen fällt kontinuierlich bis zum Alter von 8 Jahren. Mit dem 9. Lebensjahr steigt die Motivation zur Mundhygiene, um anschließend wieder zu fallen.




Abbildung 56: Mundhygiene / Geschlecht




Abbildung 57: Mundhygiene / Kindergarten – Schule




Abbildung 58: Mundhygiene / urban – nicht urban




Abbildung 59: Mundhygiene / Viertel




Abbildung 60: Mundhygiene / Jahrgang






Abbildung 61: Mundhygiene / Alter




Abbildung 62: Mundhygiene / Bezirk

KIEFERORTHOPÄDIE

Mehr als einem Drittel (35,9 Prozent) der untersuchten Kinder wird eine Kontrolle im Bereich der Kieferorthopädie empfohlen, Mädchen (37,2 Prozent) betrifft dies häufiger wie ihre männlichen Kollegen (34,7 Prozent).

Der Anteil von 23,8 Prozent in den Kindergärten steigt erwartungsgemäß in den Schulen (46,2 Prozent). Sind es bei den 3-, 4- und 5-jährigen jeweils rund ein Viertel, so steigt dieser Anteil zwischen dem 6ten und dem 8ten Lebensjahr kontinuierlich auf zirka 50 Prozent an und stabilisiert sich im Alter dann.




Abbildung 63: Kieferorthopädie empfohlen / Geschlecht




Abbildung 64: Kieferorthopädie empfohlen / Kindergarten – Schule




Abbildung 65: Kieferorthopädie empfohlen / urban – nicht urban




Abbildung 66: Kieferorthopädie empfohlen / Viertel




Abbildung 67: Kieferorthopädie empfohlen / Jahrgang






Abbildung 68: Kieferorthopädie empfohlen / Alter




Abbildung 69: Kieferorthopädie empfohlen / Bezirk

KARIES

38,1 Prozent der untersuchten Kinder wird eine Behandlung bzw. Kontrolle im Bereich Karies empfohlen, Mädchen (36,0 Prozent) betrifft dies seltener wie ihre männlichen Kollegen (39,9 Prozent). Auch im urbanen Gebiet (41,8 Prozent) wird eine Behandlung bzw. eine Karieskontrolle deutlich häufiger empfohlen als im ländlichen Bereich (37,3 Prozent).

Der Anteil in den Kindergärten von 30,1 Prozent steigt in den Schulen auf 44,9 Prozent. Betrachtet man die Empfehlung bezüglich des Alters so zeigt sich, dass der Anteil derer, die eine Karieskontrolle oder Behandlung empfohlen bekommen haben, stark ansteigt (2-jährige 8,8 Prozent, 8-jährige 64,6 Prozent). Im Alter von 9 Jahren nimmt, parallel zum Anteil der kariösen Zähne, der Anteil der Notwendigkeit einer Behandlung bzw. Kontrolle ab und steigt erst im Alter von 11 Jahren wieder auf mehr als 50 Prozent.




Abbildung 70: Karies / Geschlecht




Abbildung 71: Karies / Kindergarten – Schule




Abbildung 72: Karies / urban – nicht urban




Abbildung 73: Karies / Viertel




Abbildung 74: Karies / Jahrgang




Abbildung 75: Karies / Alter




Abbildung 76: Karies / Bezirk

TABELLENBAND



| | Gesamt | | Geschlecht | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | weiblich | | männlich | |
| Personen: | 44.618 | | 21.444 | | 22.836 | |
| Geschlecht: | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 21.444 | 100% | 0 | 0% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 0 | 0% | 22.836 | 100% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 6,98 | | 7,07 | |
| Art der Zähne: | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 315.117 | 67,9% | 342.786 | 69,8% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 148.882 | 32,1% | 148.400 | 30,2% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 463.999 | | 491.186 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 91 | 0,0% | 51 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 1.285 | 0,9% | 1.195 | 0,8% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | 0,3% | 1.376 | 0,3% | 1.246 | 0,3% |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 21,64 | | 21,51 | |
| Mundhygiene: | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 17.072 | 81,8% | 17.153 | 77,3% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 3.794 | 18,2% | 5.028 | 22,7% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 7.747 | 37,2% | 7.673 | 34,7% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 13.099 | 62,8% | 14.462 | 65,3% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 7.455 | 36,0% | 8.786 | 39,9% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 13.244 | 64,0% | 13.238 | 60,1% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 7.884 | 36,8% | 9.298 | 40,7% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 10.100 | 47,1% | 11.638 | 51,0% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 4.026 | 18,8% | 4.282 | 18,8% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 2.476 | 11,5% | 2.877 | 12,6% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 3.598 | 16,8% | 4.479 | 19,6% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 11.344 | 52,9% | 11.198 | 49,0% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 1,95 | | 2,23 | |
| dmft | 1,79 | | 1,64 | | 1,93 | |

| | Gesamt | | Kindergarten / Schule | | | |
|---|----------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | Kindergarten | | Schule | |
| Personen: | 44.618 | | 20.603 | | 24.015 | |
| Geschlecht: | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 10.058 | 48,8% | 11.386 | 47,4% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 10.405 | 50,5% | 12.431 | 51,8% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 4,93 | | 8,82 | |
| Art der Zähne: | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 395.770 | 95,3% | 266.740 | 48,7% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 19.321 | 4,7% | 280.421 | 51,3% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 415.091 | | 547.161 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 41 | 0,0% | 101 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 64 | 0,3% | 2.436 | 0,9% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | 0,3% | 105 | 0,0% | 2.537 | 0,5% |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 20,15 | | 22,78 | |
| Mundhygiene: | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 17.236 | 86,5% | 17.155 | 73,4% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 2.692 | 13,5% | 6.204 | 26,6% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 4.740 | 23,8% | 10.760 | 46,2% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 15.157 | 76,2% | 12.555 | 53,8% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 5.945 | 30,1% | 10.402 | 44,9% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 13.833 | 69,9% | 12.778 | 55,1% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind. 1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 6.329 | 30,7% | 10.999 | 45,8% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 7.493 | 36,4% | 14.438 | 60,1% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 2.943 | 14,3% | 5.425 | 22,6% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 1.577 | 7,7% | 3.826 | 15,9% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 2.973 | 14,4% | 5.187 | 21,6% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 13.110 | 63,6% | 9.577 | 39,9% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 1,71 | | 2,44 | |
| dmft | 1,79 | | 1,69 | | 1,88 | |

| | Gesamt | | urban / nicht urban | | | |
|---|----------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | urban | | nicht urban | |
| Personen: | 44.618 | | 7.595 | | 37.023 | |
| Geschlecht: | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 3.648 | 48,0% | 17.796 | 48,1% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 3.907 | 51,4% | 18.929 | 51,1% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 7,04 | | 7,02 | |
| Art der Zähne: | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 112.736 | 68,8% | 549.774 | 68,9% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 51.045 | 31,2% | 248.697 | 31,1% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 163.781 | | 798.471 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 15 | 0,0% | 127 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 431 | 0,8% | 2.069 | 0,8% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | 0,3% | 446 | 0,3% | 2.196 | 0,3% |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 21,56 | | 21,57 | |
| Mundhygiene: | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 5.532 | 74,7% | 28.859 | 80,4% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 1.872 | 25,3% | 7.024 | 19,6% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 2.474 | 34,1% | 13.026 | 36,2% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 4.777 | 65,9% | 22.935 | 63,8% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 3.088 | 41,8% | 13.259 | 37,3% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 4.298 | 58,2% | 22.313 | 62,7% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind. 1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 3.232 | 42,6% | 14.096 | 38,1% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 3.975 | 52,3% | 17.956 | 48,5% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 1.414 | 18,6% | 6.954 | 18,8% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 993 | 13,1% | 4.410 | 11,9% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 1.568 | 20,6% | 6.592 | 17,8% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 3.620 | 47,7% | 19.067 | 51,5% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 2,33 | | 2,05 | |
| dmft | 1,79 | | 2,01 | | 1,75 | |

| | Gesamt | | Viertel | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | Mostviertel | | Industrieviertel | | Weinviertel | | Waldviertel | |
| Personen: | 44.618 | | 12.535 | | 16.762 | | 9.173 | | 6.148 | |
| Geschlecht: | | | | | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 6.125 | 48,9% | 7.963 | 47,5% | 4.380 | 47,7% | 2.976 | 48,4% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 6.355 | 50,7% | 8.686 | 51,8% | 4.722 | 51,5% | 3.073 | 50,0% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 7,02 | | 6,93 | | 7,05 | | 7,28 | |
| Art der Zähne: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 185.456 | 69,0% | 251.580 | 69,5% | 136.264 | 68,8% | 89.210 | 66,9% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 83.347 | 31,0% | 110.422 | 30,5% | 61.793 | 31,2% | 44.180 | 33,1% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 268.803 | | 362.002 | | 198.057 | | 133.390 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 28 | 0,0% | 54 | 0,0% | 18 | 0,0% | 42 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 654 | 0,8% | 954 | 0,9% | 435 | 0,7% | 457 | 1,0% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | 0,3% | 682 | 0,3% | 1.008 | 0,3% | 453 | 0,2% | 499 | 0,4% |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 21,44 | | 21,60 | | 21,59 | | 21,70 | |
| Mundhygiene: | | | | | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 9.742 | 80,4% | 12.777 | 78,6% | 7.131 | 78,8% | 4.741 | 80,8% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 2.382 | 19,6% | 3.471 | 21,4% | 1.920 | 21,2% | 1.123 | 19,2% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 4.555 | 37,3% | 5.868 | 36,2% | 3.192 | 35,8% | 1.885 | 32,1% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 7.646 | 62,7% | 10.335 | 63,8% | 5.735 | 64,2% | 3.996 | 67,9% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 4.902 | 40,5% | 5.769 | 36,2% | 3.183 | 35,4% | 2.493 | 42,1% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 7.215 | 59,5% | 10.165 | 63,8% | 5.802 | 64,6% | 3.429 | 57,9% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 5.170 | 41,2% | 6.134 | 36,6% | 3.380 | 36,8% | 2.644 | 43,0% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 6.595 | 52,6% | 7.706 | 46,0% | 4.222 | 46,0% | 3.408 | 55,4% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 2.497 | 19,9% | 2.905 | 17,3% | 1.701 | 18,5% | 1.265 | 20,6% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 1.618 | 12,9% | 1.899 | 11,3% | 1.013 | 11,0% | 873 | 14,2% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 2.480 | 19,8% | 2.902 | 17,3% | 1.508 | 16,4% | 1.270 | 20,7% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 5.940 | 47,4% | 9.056 | 54,0% | 4.951 | 54,0% | 2.740 | 44,6% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 2,24 | | 2,02 | | 1,89 | | 2,34 | |
| dmft | 1,79 | | 1,93 | | 1,73 | | 1,59 | | 1,99 | |

| | Gesamt | | Jahrgang | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | Jg. 2007 u. jünger | | Jg. 2006 | | Jg. 2005 | | Jg. 2004 | |
| Personen: | 44.618 | | 1.581 | | 4.696 | | 5.862 | | 6.497 | |
| Geschlecht: | | | | | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 788 | 49,8% | 2.284 | 48,6% | 2.907 | 49,6% | 3.189 | 49,1% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 787 | 49,8% | 2.373 | 50,5% | 2.912 | 49,7% | 3.265 | 50,3% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 3,01 | | 3,84 | | 4,83 | | 5,81 | |
| Art der Zähne: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 31.218 | 100,0% | 93.243 | 100,0% | 115.491 | 99,4% | 122.105 | 92,1% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 6 | 0,0% | 0 | 0,0% | 659 | 0,6% | 10.482 | 7,9% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 31.224 | | 93.243 | | 116.150 | | 132.587 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 4 | 0,0% | 1 | 0,0% | 19 | 0,0% | 12 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 0 | 0,0% | 0 | #DIV/0! | 1 | 0,2% | 24 | 0,2% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | 0,3% | 4 | 0,0% | 1 | 0,0% | 20 | 0,0% | 36 | 0,0% |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 19,75 | | 19,86 | | 19,81 | | 20,41 | |
| Mundhygiene: | | | | | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 1.441 | 93,8% | 4.096 | 90,2% | 4.905 | 86,6% | 5.236 | 83,4% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 96 | 6,2% | 445 | 9,8% | 761 | 13,4% | 1.039 | 16,6% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 368 | 24,2% | 1.122 | 24,7% | 1.251 | 22,1% | 1.421 | 22,7% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 1.151 | 75,8% | 3.429 | 75,3% | 4.421 | 77,9% | 4.838 | 77,3% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 182 | 12,0% | 940 | 20,9% | 1.717 | 30,5% | 2.318 | 37,1% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 1.332 | 88,0% | 3.547 | 79,1% | 3.911 | 69,5% | 3.932 | 62,9% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 202 | 12,8% | 1.004 | 21,4% | 1.827 | 31,2% | 2.467 | 38,0% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 295 | 18,7% | 1.173 | 25,0% | 2.109 | 36,0% | 2.919 | 44,9% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 140 | 8,9% | 560 | 11,9% | 796 | 13,6% | 1.079 | 16,6% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 70 | 4,4% | 222 | 4,7% | 454 | 7,7% | 628 | 9,7% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 85 | 5,4% | 391 | 8,3% | 859 | 14,7% | 1.212 | 18,7% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 1.286 | 81,3% | 3.523 | 75,0% | 3.753 | 64,0% | 3.578 | 55,1% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 0,72 | | 1,07 | | 1,76 | | 2,15 | |
| dmft | 1,79 | | 0,72 | | 1,07 | | 1,76 | | 2,13 | |

| | Gesamt | | Jahrgang | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| | | | Jg. 2003 | | Jg. 2002 | | Jg. 2001 u. älter | |
| Personen: | 44.618 | | 8.466 | | 4.907 | | 12.609 | |
| Geschlecht: | | | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 4.066 | 48,0% | 2.183 | 44,5% | 6.027 | 47,8% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 4.339 | 51,3% | 2.685 | 54,7% | 6.475 | 51,4% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 6,84 | | 7,58 | | 10,27 | |
| Art der Zähne: | | | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 134.131 | 72,3% | 66.166 | 60,1% | 100.156 | 34,1% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 51.461 | 27,7% | 43.941 | 39,9% | 193.193 | 65,9% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 185.592 | | 110.107 | | 293.349 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 37 | 0,0% | 18 | 0,0% | 51 | 0,1% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 322 | 0,6% | 279 | 0,6% | 1.874 | 1,0% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | 0,3% | 359 | 0,2% | 297 | 0,3% | 1.925 | 0,7% |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 21,92 | | 22,44 | | 23,27 | |
| Mundhygiene: | | | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 6.398 | 78,0% | 3.420 | 71,9% | 8.895 | 72,3% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 1.802 | 22,0% | 1.338 | 28,1% | 3.415 | 27,7% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 2.903 | 35,5% | 2.182 | 45,9% | 6.253 | 50,9% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 5.282 | 64,5% | 2.571 | 54,1% | 6.020 | 49,1% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 3.372 | 41,2% | 2.374 | 49,9% | 5.444 | 44,9% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 4.820 | 58,8% | 2.386 | 50,1% | 6.683 | 55,1% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind. 1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 3.538 | 41,8% | 2.498 | 50,9% | 5.792 | 45,9% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 4.336 | 51,2% | 3.026 | 61,7% | 8.073 | 64,0% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 1.623 | 19,2% | 1.002 | 20,4% | 3.168 | 25,1% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 981 | 11,6% | 711 | 14,5% | 2.337 | 18,5% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 1.732 | 20,5% | 1.313 | 26,8% | 2.568 | 20,4% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 4.130 | 48,8% | 1.881 | 38,3% | 4.536 | 36,0% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 2,24 | | 2,81 | | 2,42 | |
| dmft | 1,79 | | 2,11 | | 2,50 | | 1,56 | |

| | Gesamt | | Alter | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | 2 jährige | | 3 jährige | | 4 jährige | |
| Personen: | 44.618 | | 684 | | 3.990 | | 5.492 | |
| Geschlecht: | | | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 338 | 49,4% | 1.958 | 49,1% | 2.717 | 49,5% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 343 | 50,1% | 2.000 | 50,1% | 2.739 | 49,9% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 2,79 | | 3,56 | | 4,52 | |
| Art der Zähne: | | | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 13.451 | 100,0% | 79.250 | 100,0% | 108.635 | 99,9% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 160 | 0,1% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 13.451 | | 79.250 | | 108.795 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 4 | 0,0% | 0 | 0,0% | 5 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | 0,3% | 4 | 0,0% | 0 | 0,0% | 5 | 0,0% |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 19,67 | | 19,86 | | 19,81 | |
| Mundhygiene: | | | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 624 | 94,0% | 3.520 | 91,1% | 4.649 | 87,4% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 40 | 6,0% | 342 | 8,9% | 669 | 12,6% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 164 | 25,0% | 992 | 25,7% | 1.191 | 22,4% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 493 | 75,0% | 2.868 | 74,3% | 4.129 | 77,6% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 58 | 8,8% | 697 | 18,3% | 1.480 | 28,2% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 600 | 91,2% | 3.122 | 81,7% | 3.775 | 71,8% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind. 1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 64 | 9,4% | 750 | 18,8% | 1.566 | 28,5% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 129 | 18,9% | 891 | 22,3% | 1.789 | 32,6% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 63 | 9,2% | 424 | 10,6% | 732 | 13,3% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 36 | 5,3% | 178 | 4,5% | 364 | 6,6% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 30 | 4,4% | 289 | 7,2% | 693 | 12,6% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 555 | 81,1% | 3.099 | 77,7% | 3.703 | 67,4% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 0,68 | | 0,94 | | 1,54 | |
| dmft | 1,79 | | 0,68 | | 0,94 | | 1,54 | |

| | Gesamt | | Alter | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | 5 jährige | | 6 jährige | | 7 jährige | | 8 jährige | |
| Personen: | 44.618 | | 6.421 | | 7.636 | | 7.334 | | 812 | |
| Geschlecht: | | | | | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 3.158 | 49,2% | 3.683 | 48,2% | 3.383 | 46,1% | 332 | 40,9% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 3.222 | 50,2% | 3.909 | 51,2% | 3.883 | 52,9% | 469 | 57,8% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 5,50 | | 6,54 | | 7,39 | | 8,32 | |
| Art der Zähne: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 123.759 | 95,9% | 128.618 | 78,3% | 103.093 | 62,8% | 9.489 | 51,9% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 5.314 | 4,1% | 35.627 | 21,7% | 60.950 | 37,2% | 8.800 | 48,1% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 129.073 | | 164.245 | | 164.043 | | 18.289 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 27 | 0,0% | 10 | 0,0% | 45 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 5 | 0,1% | 189 | 0,5% | 412 | 0,7% | 34 | 0,4% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | | 32 | | 199 | | 457 | | 34 | |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 20,10 | | 21,51 | | 22,37 | | 22,52 | |
| Mundhygiene: | | | | | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 5.266 | 84,7% | 5.944 | 80,2% | 5.245 | 74,1% | 438 | 56,1% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 948 | 15,3% | 1.463 | 19,8% | 1.833 | 25,9% | 343 | 43,9% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 1.344 | 21,7% | 2.288 | 31,0% | 3.056 | 43,2% | 409 | 52,6% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 4.859 | 78,3% | 5.100 | 69,0% | 4.026 | 56,8% | 369 | 47,4% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 2.139 | 34,6% | 2.952 | 40,0% | 3.323 | 46,8% | 502 | 64,6% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 4.051 | 65,4% | 4.433 | 60,0% | 3.772 | 53,2% | 275 | 35,4% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 2.288 | 35,6% | 3.110 | 40,7% | 3.484 | 47,5% | 533 | 65,6% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 2.711 | 42,2% | 3.763 | 49,3% | 4.252 | 58,0% | 620 | 76,4% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 1.001 | 15,6% | 1.408 | 18,4% | 1.485 | 20,2% | 156 | 19,2% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 573 | 8,9% | 834 | 10,9% | 1.006 | 13,7% | 153 | 18,8% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 1.137 | 17,7% | 1.521 | 19,9% | 1.761 | 24,0% | 311 | 38,3% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 3.710 | 57,8% | 3.873 | 50,7% | 3.082 | 42,0% | 192 | 23,6% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 2,05 | | 2,22 | | 2,56 | | 3,92 | |
| dmft | 1,79 | | 2,04 | | 2,14 | | 2,31 | | 3,25 | |

| | Gesamt | | Alter | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | | 9 jährige | | 10 jährige | | 11 jährige | | 12 jährige u. älter | |
| Personen: | 44.618 | | 3.888 | | 7.281 | | 743 | | 325 | |
| Geschlecht: | | | | | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 1.997 | 51,4% | 3.461 | 47,5% | 295 | 39,7% | 117 | 36,0% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 1.866 | 48,0% | 3.753 | 51,5% | 441 | 59,4% | 204 | 62,8% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 9,77 | | 10,36 | | 11,32 | | 13,94 | |
| Art der Zähne: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 37.965 | 42,5% | 54.744 | 32,3% | 2.973 | 16,8% | 352 | 4,2% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 51.426 | 57,5% | 114.781 | 67,7% | 14.691 | 83,2% | 7.993 | 95,8% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 89.391 | | 169.525 | | 17.664 | | 8.345 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 20 | 0,1% | 31 | 0,1% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 600 | 1,2% | 1.199 | 1,0% | 55 | 0,4% | 6 | 0,1% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | 0,3% | 620 | 0,7% | 1.230 | 0,7% | 55 | 0,3% | 6 | 0,1% |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 22,99 | | 23,28 | | 23,77 | | 25,68 | |
| Mundhygiene: | | | | | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 2.860 | 75,3% | 5.291 | 74,3% | 414 | 57,8% | 128 | 40,5% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 940 | 24,7% | 1.828 | 25,7% | 302 | 42,2% | 188 | 59,5% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 1.932 | 50,9% | 3.557 | 50,2% | 394 | 55,0% | 173 | 55,4% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 1.865 | 49,1% | 3.530 | 49,8% | 322 | 45,0% | 139 | 44,6% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 1.647 | 44,0% | 2.977 | 42,5% | 376 | 53,3% | 196 | 61,8% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 2.096 | 56,0% | 4.024 | 57,5% | 330 | 46,7% | 121 | 38,2% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 1.758 | 45,2% | 3.176 | 43,6% | 402 | 54,1% | 197 | 60,6% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 2.435 | 62,6% | 4.537 | 62,3% | 542 | 72,9% | 262 | 80,6% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 1.003 | 25,8% | 1.852 | 25,4% | 177 | 23,8% | 67 | 20,6% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 676 | 17,4% | 1.315 | 18,1% | 186 | 25,0% | 82 | 25,2% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 756 | 19,4% | 1.370 | 18,8% | 179 | 24,1% | 113 | 34,8% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 1.453 | 37,4% | 2.744 | 37,7% | 201 | 27,1% | 63 | 19,4% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 2,31 | | 2,27 | | 2,91 | | 3,82 | |
| dmft | 1,79 | | 1,74 | | 1,46 | | 1,13 | | 0,34 | |

| | Gesamt | | Bezirk | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | | Krems an der Donau | | Sankt Pölten | | Waidhofen an der Ybbs | | Wiener Neustadt | |
| Personen: | 44.618 | | 540 | | 564 | | 446 | | 1.009 | |
| Geschlecht: | | | | | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 252 | 46,7% | 271 | 48,0% | 216 | 48,4% | 462 | 45,8% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 287 | 53,1% | 292 | 51,8% | 227 | 50,9% | 539 | 53,4% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 7,38 | | 5,11 | | 8,27 | | 6,83 | |
| Art der Zähne: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 7.713 | 65,7% | 10.546 | 94,8% | 5.146 | 52,8% | 15.089 | 69,9% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 4.019 | 34,3% | 573 | 5,2% | 4.592 | 47,2% | 6.501 | 30,1% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 11.732 | | 11.119 | | 9.738 | | 21.590 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 0 | 0,0% | 2 | 0,0% | 0 | 0,0% | 6 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 79 | 2,0% | 2 | 0,3% | 37 | 0,8% | 18 | 0,3% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | | 79 | | 4 | | 37 | | 24 | |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 21,73 | | 19,71 | | 21,83 | | 21,40 | |
| Mundhygiene: | | | | | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 427 | 82,3% | 447 | 84,7% | 226 | 58,1% | 733 | 73,7% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 92 | 17,7% | 81 | 15,3% | 163 | 41,9% | 262 | 26,3% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 220 | 41,7% | 110 | 19,7% | 145 | 37,6% | 311 | 32,3% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 307 | 58,3% | 447 | 80,3% | 241 | 62,4% | 652 | 67,7% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 231 | 44,0% | 204 | 38,7% | 214 | 51,7% | 439 | 44,1% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 294 | 56,0% | 323 | 61,3% | 200 | 48,3% | 557 | 55,9% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 237 | 43,9% | 233 | 41,3% | 246 | 55,2% | 449 | 44,5% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 294 | 54,4% | 256 | 45,4% | 311 | 69,7% | 529 | 52,4% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 117 | 21,7% | 81 | 14,4% | 107 | 24,0% | 173 | 17,1% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 84 | 15,6% | 52 | 9,2% | 77 | 17,3% | 142 | 14,1% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 93 | 17,2% | 123 | 21,8% | 127 | 28,5% | 214 | 21,2% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 246 | 45,6% | 308 | 54,6% | 135 | 30,3% | 480 | 47,6% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 2,11 | | 2,56 | | 3,09 | | 2,49 | |
| dmft | 1,79 | | 1,79 | | 2,54 | | 2,30 | | 2,12 | |

| | Gesamt | | Bezirk | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Amstetten | | Baden | | Bruck an der Leitha | | Gänserndorf | |
| Personen: | 44.618 | | 3.106 | | 3.292 | | 1.076 | | 2.531 | |
| Geschlecht: | | | | | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 1.473 | 47,4% | 1.532 | 46,5% | 545 | 50,7% | 1.203 | 47,5% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 1.624 | 52,3% | 1.737 | 52,8% | 528 | 49,1% | 1.313 | 51,9% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 7,05 | | 7,37 | | 6,65 | | 7,23 | |
| Art der Zähne: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 45.750 | 68,4% | 46.817 | 65,1% | 16.615 | 71,6% | 37.480 | 68,9% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 21.119 | 31,6% | 25.080 | 34,9% | 6.600 | 28,4% | 16.913 | 31,1% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 66.869 | | 71.897 | | 23.215 | | 54.393 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 5 | 0,0% | 13 | 0,0% | 7 | 0,0% | 3 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 218 | 1,0% | 132 | 0,5% | 57 | 0,9% | 147 | 0,9% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | 0,3% | 223 | 0,3% | 145 | 0,2% | 64 | 0,3% | 150 | 0,3% |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 21,53 | | 21,84 | | 21,58 | | 21,49 | |
| Mundhygiene: | | | | | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 2.487 | 82,8% | 2.357 | 75,6% | 918 | 86,0% | 1.899 | 76,7% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 515 | 17,2% | 760 | 24,4% | 149 | 14,0% | 576 | 23,3% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 1.103 | 36,8% | 1.152 | 36,0% | 383 | 36,1% | 655 | 27,1% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 1.895 | 63,2% | 2.052 | 64,0% | 677 | 63,9% | 1.762 | 72,9% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 1.218 | 40,5% | 1.253 | 41,1% | 371 | 34,6% | 957 | 38,9% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 1.788 | 59,5% | 1.794 | 58,9% | 700 | 65,4% | 1.505 | 61,1% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 1.278 | 41,1% | 1.347 | 40,9% | 383 | 35,6% | 1.030 | 40,7% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 1.676 | 54,0% | 1.643 | 49,9% | 455 | 42,3% | 1.213 | 47,9% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 633 | 20,4% | 555 | 16,9% | 183 | 17,0% | 449 | 17,7% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 408 | 13,1% | 418 | 12,7% | 139 | 12,9% | 279 | 11,0% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 635 | 20,4% | 670 | 20,4% | 133 | 12,4% | 485 | 19,2% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 1.430 | 46,0% | 1.649 | 50,1% | 621 | 57,7% | 1.318 | 52,1% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 2,28 | | 2,32 | | 1,59 | | 2,12 | |
| dmft | 1,79 | | 2,02 | | 1,94 | | 1,42 | | 1,74 | |

| | Gesamt | | Bezirk | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Gmünd | | Hollabrunn | | Horn | | Korneuburg | |
| Personen: | 44.618 | | 934 | | 1.721 | | 1.046 | | 2.429 | |
| Geschlecht: | | | | | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 448 | 48,0% | 819 | 47,6% | 474 | 45,3% | 1.163 | 47,9% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 476 | 51,0% | 890 | 51,7% | 485 | 46,4% | 1.228 | 50,6% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 7,02 | | 6,89 | | 7,00 | | 6,74 | |
| Art der Zähne: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 13.879 | 68,6% | 25.925 | 69,9% | 15.499 | 68,8% | 37.441 | 71,8% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 6.353 | 31,4% | 11.159 | 30,1% | 7.017 | 31,2% | 14.698 | 28,2% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 20.232 | | 37.084 | | 22.516 | | 52.139 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 5 | 0,1% | 91 | 0,8% | 32 | 0,5% | 109 | 0,7% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | | 5 | | 91 | | 32 | | 112 | |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 21,66 | | 21,55 | | 21,53 | | 21,47 | |
| Mundhygiene: | | | | | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 790 | 85,5% | 1.298 | 76,1% | 692 | 84,0% | 1.938 | 80,5% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 134 | 14,5% | 408 | 23,9% | 132 | 16,0% | 470 | 19,5% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 199 | 23,1% | 623 | 37,1% | 230 | 24,4% | 950 | 39,7% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 662 | 76,9% | 1.055 | 62,9% | 712 | 75,6% | 1.443 | 60,3% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 348 | 40,3% | 561 | 32,9% | 327 | 34,9% | 756 | 31,6% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 515 | 59,7% | 1.145 | 67,1% | 609 | 65,1% | 1.639 | 68,4% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 396 | 42,4% | 588 | 34,2% | 385 | 36,8% | 778 | 32,0% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 491 | 52,6% | 739 | 42,9% | 518 | 49,5% | 1.027 | 42,3% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 194 | 20,8% | 320 | 18,6% | 228 | 21,8% | 430 | 17,7% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 141 | 15,1% | 211 | 12,3% | 121 | 11,6% | 229 | 9,4% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 156 | 16,7% | 208 | 12,1% | 169 | 16,2% | 368 | 15,2% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 443 | 47,4% | 982 | 57,1% | 528 | 50,5% | 1.402 | 57,7% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 2,13 | | 1,58 | | 1,92 | | 1,70 | |
| dmft | 1,79 | | 1,93 | | 1,39 | | 1,70 | | 1,49 | |

| | Gesamt | | Bezirk | | | | | | | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Krems Land | | Lilienfeld | | Melk | | Mistelbach | |
| Personen: | 44.618 | | 1.528 | | 655 | | 2.152 | | 2.165 | |
| Geschlecht: | | | | | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 726 | 47,5% | 318 | 48,5% | 1.066 | 49,5% | 1.040 | 48,0% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 799 | 52,3% | 336 | 51,3% | 1.081 | 50,2% | 1.119 | 51,7% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 7,47 | | 7,62 | | 7,54 | | 6,92 | |
| Art der Zähne: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 21.670 | 64,8% | 8.499 | 59,3% | 29.385 | 62,9% | 32.324 | 68,9% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 11.780 | 35,2% | 5.834 | 40,7% | 17.321 | 37,1% | 14.599 | 31,1% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 33.450 | | 14.333 | | 46.706 | | 46.923 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 34 | 0,2% | 8 | 0,1% | 6 | 0,0% | 8 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 110 | 0,9% | 104 | 1,8% | 67 | 0,4% | 65 | 0,4% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | | 144 | | 112 | | 73 | | 73 | |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 21,89 | | 21,88 | | 21,70 | | 21,67 | |
| Mundhygiene: | | | | | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 1.239 | 81,9% | 497 | 76,5% | 1.700 | 80,7% | 1.729 | 80,9% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 273 | 18,1% | 153 | 23,5% | 407 | 19,3% | 408 | 19,1% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 549 | 36,5% | 303 | 47,0% | 794 | 37,5% | 796 | 37,7% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 957 | 63,5% | 341 | 53,0% | 1.326 | 62,5% | 1.318 | 62,3% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 633 | 42,9% | 308 | 47,5% | 980 | 46,0% | 830 | 39,5% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 844 | 57,1% | 340 | 52,5% | 1.149 | 54,0% | 1.270 | 60,5% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind.1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 664 | 43,5% | 314 | 47,9% | 1.003 | 46,6% | 891 | 41,2% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 836 | 54,7% | 404 | 61,7% | 1.296 | 60,2% | 1.072 | 49,5% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 337 | 22,1% | 150 | 22,9% | 440 | 20,4% | 424 | 19,6% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 231 | 15,1% | 89 | 13,6% | 350 | 16,3% | 248 | 11,5% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 268 | 17,5% | 165 | 25,2% | 506 | 23,5% | 400 | 18,5% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 692 | 45,3% | 251 | 38,3% | 856 | 39,8% | 1.093 | 50,5% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 2,15 | | 2,76 | | 2,59 | | 2,13 | |
| dmft | 1,79 | | 1,76 | | 2,22 | | 2,09 | | 1,80 | |

| | Gesamt | | Bezirk | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | Mödling | | Neunkirchen | | St.Pölten Land | |
| Personen: | 44.618 | | 3.571 | | 2.418 | | 2.592 | |
| Geschlecht: | | | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 1.683 | 47,1% | 1.167 | 48,3% | 1.266 | 48,8% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 1.858 | 52,0% | 1.241 | 51,3% | 1.306 | 50,4% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 6,62 | | 6,87 | | 7,03 | |
| Art der Zähne: | | | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 55.804 | 72,7% | 36.065 | 69,4% | 38.366 | 68,7% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 20.993 | 27,3% | 15.916 | 30,6% | 17.470 | 31,3% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 76.797 | | 51.981 | | 55.836 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 14 | 0,0% | 8 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 454 | 2,2% | 85 | 0,5% | 113 | 0,6% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | 0,3% | 468 | 0,6% | 93 | 0,2% | 113 | 0,2% |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 21,51 | | 21,50 | | 21,54 | |
| Mundhygiene: | | | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 2.611 | 77,1% | 1.901 | 79,8% | 1.963 | 78,3% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 775 | 22,9% | 480 | 20,2% | 545 | 21,7% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 1.189 | 35,7% | 857 | 36,1% | 884 | 34,6% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 2.141 | 64,3% | 1.514 | 63,9% | 1.669 | 65,4% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 996 | 29,5% | 899 | 38,0% | 982 | 39,4% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 2.376 | 70,5% | 1.469 | 62,0% | 1.508 | 60,6% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind. 1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 1.069 | 29,9% | 922 | 38,1% | 1.053 | 40,6% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 1.378 | 38,6% | 1.238 | 51,2% | 1.317 | 50,8% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 549 | 15,4% | 470 | 19,4% | 524 | 20,2% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 324 | 9,1% | 303 | 12,5% | 296 | 11,4% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 505 | 14,1% | 465 | 19,2% | 497 | 19,2% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 2.193 | 61,4% | 1.180 | 48,8% | 1.275 | 49,2% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 1,70 | | 2,22 | | 2,13 | |
| dmft | 1,79 | | 1,49 | | 1,92 | | 1,86 | |

| | Gesamt | | Bezirk | | | | | |
|---|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|
| | | | Scheibbs | | Tulln | | Waidhofen an der Thaya | |
| Personen: | 44.618 | | 1.552 | | 2.134 | | 752 | |
| Geschlecht: | | | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 785 | 50,6% | 1.056 | 49,5% | 383 | 50,9% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 765 | 49,3% | 1.065 | 49,9% | 368 | 48,9% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 6,98 | | 6,74 | | 7,26 | |
| Art der Zähne: | | | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 23.610 | 71,1% | 32.846 | 72,2% | 11.482 | 70,5% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 9.605 | 28,9% | 12.661 | 27,8% | 4.814 | 29,5% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 33.215 | | 45.507 | | 16.296 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 0 | 0,0% | 3 | 0,0% | 0 | 0,0% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 85 | 0,9% | 64 | 0,5% | 2 | 0,0% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | 0,3% | 85 | 0,3% | 67 | 0,1% | 2 | 0,0% |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 21,40 | | 21,32 | | 21,67 | |
| Mundhygiene: | | | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 1.263 | 82,0% | 1.681 | 81,6% | 567 | 75,6% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 278 | 18,0% | 378 | 18,4% | 183 | 24,4% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 609 | 39,6% | 871 | 42,2% | 207 | 29,0% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 928 | 60,4% | 1.195 | 57,8% | 508 | 71,0% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 625 | 40,5% | 641 | 31,1% | 312 | 41,8% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 917 | 59,5% | 1.418 | 68,9% | 434 | 58,2% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind. 1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 642 | 41,4% | 671 | 31,4% | 314 | 41,8% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 836 | 53,9% | 884 | 41,4% | 397 | 52,8% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 324 | 20,9% | 373 | 17,5% | 141 | 18,8% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 206 | 13,3% | 230 | 10,8% | 85 | 11,3% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 306 | 19,7% | 281 | 13,2% | 171 | 22,7% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 716 | 46,1% | 1.250 | 58,6% | 355 | 47,2% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 2,22 | | 1,60 | | 2,38 | |
| dmft | 1,79 | | 1,91 | | 1,36 | | 2,01 | |

| | Gesamt | | Bezirk | | | | | |
|---|----------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Wiener Neustadt Land | | Wien- Umgebung | | Zwettl | |
| Personen: | 44.618 | | 2.024 | | 3.137 | | 1.244 | |
| Geschlecht: | | | | | | | | |
| weiblich | 21.444 | 48,1% | 962 | 47,5% | 1.505 | 48,0% | 629 | 50,6% |
| männlich | 22.836 | 51,2% | 1.042 | 51,5% | 1.616 | 51,5% | 614 | 49,4% |
| Durchschnittsalter: | 7,03 | | 7,10 | | 7,06 | | 7,29 | |
| Art der Zähne: | | | | | | | | |
| Milchzähne | 662.510 | 68,8% | 29.503 | 67,6% | 47.138 | 69,2% | 17.918 | 66,5% |
| bleibende Zähne | 299.742 | 31,2% | 14.152 | 32,4% | 20.954 | 30,8% | 9.019 | 33,5% |
| Zähne gesamt | 962.252 | | 43.655 | | 68.092 | | 26.937 | |
| Fissurenversiegelung: | | | | | | | | |
| Milchzähne fissurenversiegelt | 142 | 0,0% | 5 | 0,0% | 1 | 0,0% | 16 | 0,1% |
| bleibende Zähne fissurenversiegelt | 2.500 | 0,8% | 87 | 0,6% | 121 | 0,6% | 216 | 2,4% |
| Zähne gesamt fissurenversiegelt | 2.642 | 0,3% | 92 | 0,2% | 122 | 0,2% | 232 | 0,9% |
| Zähne pro Gebiss (pro Person) | 21,57 | | 21,57 | | 21,71 | | 21,65 | |
| Mundhygiene: | | | | | | | | |
| ja | 34.391 | 79,4% | 1.488 | 74,6% | 2.581 | 83,8% | 959 | 78,2% |
| nein | 8.896 | 20,6% | 506 | 25,4% | 500 | 16,2% | 268 | 21,8% |
| Kieferorthopädie - Kontrolle: | | | | | | | | |
| ja | 15.500 | 35,9% | 783 | 40,1% | 1.121 | 36,2% | 456 | 37,3% |
| nein | 27.712 | 64,1% | 1.171 | 59,9% | 1.974 | 63,8% | 765 | 62,7% |
| Karies - Kontrolle: | | | | | | | | |
| ja | 16.347 | 38,1% | 834 | 42,1% | 885 | 30,8% | 543 | 44,3% |
| nein | 26.611 | 61,9% | 1.146 | 57,9% | 1.989 | 69,2% | 682 | 55,7% |
| Zustand der Gebisse: | | | | | | | | |
| kariös (Personen mit mind. 1 kariösen Zahn) | 17.328 | 38,8% | 876 | 43,3% | 991 | 31,6% | 568 | 45,7% |
| kariös, gefüllt, extrahiert | 21.931 | 49,2% | 1.066 | 52,7% | 1.291 | 41,2% | 764 | 61,4% |
| davon bis zwei | 8.368 | 18,8% | 359 | 17,7% | 578 | 18,4% | 229 | 18,4% |
| davon bis vier | 5.403 | 12,1% | 261 | 12,9% | 290 | 9,2% | 189 | 15,2% |
| davon über vier | 8.160 | 18,3% | 446 | 22,0% | 423 | 13,5% | 346 | 27,8% |
| kariesfrei, ungefüllt, nicht extrahiert | 22.687 | 50,8% | 958 | 47,3% | 1.846 | 58,8% | 480 | 38,6% |
| DMFT gemischt | 2,10 | | 2,43 | | 1,63 | | 2,89 | |
| dmft | 1,79 | | 1,95 | | 1,45 | | 2,48 | |

RECHTE

Alle Rechte an dieser statistischen Auswertung befinden sich im Eigentum des Auftraggebers. Ausgenommen sind die Rechte an den Analyseverfahren, diese bleiben bei der Jaksch & Partner GmbH.